

BMR / BHRe en EHPAD

PAS DE PANIQUE



LE PETIT QUIZ




Journée régionale de formation

Le 12 décembre 2017

Célia Moreau et Agnès Petiteau

RHC-CPIAS



BMR / BHRe



BMR

Bactéries multi-résistantes

- **SARM** (Staphylococcus Aureus Résistant à la Métiline)
- **EBLSE** (Entérobactéries productrices de Bêta-Lactamases à Spectre Étendu)
-



BHRe






Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes

- **ERV** (*Enterococcus faecium* résistant aux glycopeptides)
- **EPC** (Entérobactéries productrices de carbapénémases)

Les résidents de notre EHPAD



RHC



Mme ROSE

**Mme
MARGUERITE**

M. ATCHOUM

M. POLO

M. CHARMANT

**BMR urinaire
E.coli**

SARM cutané



**SARM
bronchique**

**BHRe
K.pneumoniae**

**Pas de
BMR/BHRe**

quiz

Sortez vos cartons...





BMR urinaire

QUESTION 1

Mme ROSE est porteuse d'une BMR dans les urines. Elle est asymptomatique.

Quelle technique d'hygiène des mains recommandez-vous ?

FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE

LAVAGE SIMPLE AU SAVON DOUX



RHC



RHC

RÉPONSE 1

FRICITION HYDRO-ALCOOLIQUE



FRICION HYDRO-ALCOOLIQUE




RHC



R8 La désinfection par friction avec un produit hydro-alcoolique est la technique de référence dans toutes les indications d'hygiène de mains en l'absence de souillure visible.

R9 En cas de mains visiblement souillées, procéder à un lavage simple des mains à l'eau et au savon doux.



15 Il est fortement recommandé de se désinfecter les mains avec un produit hydro-alcoolique dans toutes les situations où les mains ne portent pas de trace visible de souillures :

- avant et après tout acte de soins ;
- entre deux actes ou soins au même résident si le deuxième soin réclame un niveau d'hygiène supérieur au précédent (si le soignant passe d'un site contaminé à un site propre) ;
- entre deux résidents lors de soins en série.

Accord fort



BMR urinaire

FHA

Lavage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?



BMR urinaire

FHA

Lavage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

*DU pareil
...au même*

FRICITION HYDRO-ALCOOLIQUE



RHC



BMR urinaire

FHA

Lavage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

FRICITION HYDRO-ALCOOLIQUE



Pour eux aussi





BMR urinaire

QUESTION 2



**Pour la toilette de Mme ROSE,
quand recommandez-vous le port des gants ?**

LORS DE LA TOILETTE URO-GÉNITALE


POUR L'AIDE À L'HABILLAGE

RÉPONSE 2



BMR urinaire

LORS DE LA TOILETTE URO-GÉNITALE



LORS DE LA TOILETTE URO-GENITALE



RHC



R12 Porter des gants uniquement:

- en cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée,
- lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées.

Commentaire: Les soins sur peau saine s'effectuent sans gant.



BMR urinaire

Petite toilette

Habillage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?



BMR urinaire

Petite toilette

Habillage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

*DU PAREIL
...au même*

LORS DE LA TOILETTE URO-GENITALE



BMR urinaire

Petite toilette

Habillage

Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

LORS DE LA TOILETTE URO-GENITALE




Pour eux aussi





BMR urinaire

QUESTION 3



Lorsque vous réalisez le change de Mme ROSE, le port d'un tablier plastique à usage unique est-il nécessaire ?

OUI

NON

RÉPONSE 3

OUI



OUI



R15 Porter un tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit biologique d'origine humaine.

OUI



R15 Porter un tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit biologique d'origine humaine.



Pour lui aussi




Pas de BMR/BHRe



BMR urinaire

OUI

NON



Et si Mme ROSE devient symptomatique ?



BMR urinaire

OUI

NON



Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

OUI



Port d'un tablier plastique à usage unique pour tout contact direct avec le résident



R96 : Il est recommandé de revêtir un tablier plastique à usage unique comme protection spécifique de sa tenue systématiquement dès lors que s'engage un soin direct* auprès d'un patient requérant des précautions complémentaires de type contact. (AM)



BMR urinaire

OUI

NON



Et si Mme ROSE devient symptomatique ?

OUI

**Port d'un tablier plastique à usage unique
pour tout contact direct avec le résident**

Pour lui aussi



BHRe





BMR urinaire

QUESTION 4

Après le change de Mme ROSE, dans quelle poubelle éliminez-vous sa protection ?



DAOM

DASRI

RÉPONSE 4

DAOM



DAOM



R111 : Bien que réglementaire, il est recommandé de ne pas considérer comme des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI), les déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) issus d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. **(AM)**

Il est recommandé d'éliminer de la chambre, de manière pluri-quotidienne les DASRI des patients porteurs de BMR. **(AM)**

Du fait de la nature du micro-organisme impliqué, il est parfois légitime d'éliminer certains DAOM selon le circuit des DASRI ; c'est par exemple le cas de recommandations spécifiques pour les infections à *Clostridium difficile*.



BMR urinaire

DAOM

DASRI

Et si Mme ROSE présente des symptômes urinaires ?



BMR urinaire

DAOM

DASRI

Et si Mme ROSE présente des symptômes d'infection urinaire ?



DASRI



Du fait de la nature du micro-organisme impliqué, il est parfois légitime d'éliminer certains DAOM selon le circuit des DASRI ; c'est par exemple le cas de recommandations spécifiques pour les infections à *Clostridium difficile*.



BMR urinaire

DAOM

DASRI

Et si Mme ROSE présente des symptômes urinaires ?

DASRI

Pour lui aussi



BHRé





BMR urinaire

QUESTION 5

**Le fils de Mme ROSE vient lui rendre visite,
que lui recommandez-vous ?**

GANTS ET SURBLOUSE

**HYGIENE DES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT DE
LA CHAMBRE**

RÉPONSE 5

HYGIÈNE DES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT DE LA CHAMBRE



HYGIÈNE DES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT DE LA CHAMBRE



L'hygiène des mains concerne aussi les visiteurs.

R31 : Il est fortement recommandé pour les visiteurs de ne pas porter une protection de leur tenue civile lors d'une visite chez des patients quel que soit le secteur d'hospitalisation (y compris en réanimation, en soins intensifs et en surveillance continue*). (AF)

R115 : Comme pour tous les patients (cadre des précautions standard), il est fortement recommandé de réaliser un geste d'hygiène des mains (friction hydro-alcoolique) pour les visiteurs d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)
Au-delà de ce geste d'hygiène des mains, il est recommandé de ne pas demander aux visiteurs d'appliquer les autres précautions demandées aux soignants. (AM)

RÉPONSE 5

HYGIÈNE DES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT DE LA CHAMBRE



Pour lui aussi



Pas de BMR/BHRe



BHRé

**Gants et
surblouse**

Hygiène des mains

Et pour M. POLO, porteur BHRé ?



BHRé

Gants et
surblouse

Hygiène des mains

Et pour M. POLO, porteur BHRé ?

**HYGIÈNE DES MAINS EN ENTRANT ET EN SORTANT
DE LA CHAMBRE**

*DU pareil
...au même*



prévention de la transmission croisée et du risque épidémique. Les équipes de soins doivent donc veiller à informer tout particulièrement les patients, les aidants, les familles ... de l'importance qu'il y a à réaliser un geste d'hygiène des mains lors des actes simples de la vie courante (avant le repas [84], après le passage aux toilettes, etc.). Les



BMR urinaire

QUESTION 6

Vous réalisez l'entretien des surfaces hautes de la chambre de Mme ROSE.

Quel produit utilisez-vous ?

UN DETERGENT-DESINFECTANT

LA JAVEL



RÉPONSE 6



UN DÉTERGENT-DÉSINFECTANT



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)

RÉPONSE 6



UN DÉTERGENT-DÉSINFECTANT



Pour eux aussi





SARM bronchique


QUESTION 7

**M. ATCHOUM est porteur d'une BMR au niveau de l'arbre bronchique. Il tousse.
Vous devez réaliser son soin de bouche. Que faites-vous ?**

VOUS METTEZ UN MASQUE CHIRURGICAL

RIEN DE PARTICULIER

RÉPONSE 7



VOUS METTEZ UN MASQUE CHIRURGICAL



R97 : Le port d'un masque de soins (type chirurgical) à usage unique par le soignant est recommandé lors de la prise en charge d'un patient présentant une infection respiratoire impliquant un micro-organisme relevant des précautions complémentaires de type contact, notamment SARM: **(AM)**

- à proximité du patient à l'intérieur de la chambre,
- lors de soins directs.

Mais il est recommandé de ne pas porter un tel masque :

- en entrant dans la chambre, **(AF)**
- lorsque le patient ne présente pas d'infection respiratoire symptomatique **(AF)**, y compris impliquant SARM. **(AM)**

Le Masque Chirurgical pour eux aussi




- 19** Il est recommandé au personnel soignant de porter un masque en cas de toux. **Accord fort**
- 20** Il est recommandé de faire porter un masque au résident en cas de toux quand il sort de sa chambre. **Accord fort**



SARM cutané

QUESTION 8




Mme MARGUERITE est porteuse d'un SARM au niveau d'une escarre du talon, dans quelle filière éliminez-vous le linge ?

FILIÈRE SPÉCIFIQUE

FILIÈRE HABITUELLE

REPONSE 8




FILIÈRE HABITUELLE



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)

REPONSE 8



FILIÈRE HABITUELLE



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)


Pour eux aussi





SARM cutané

QUESTION 9




**Recommandez-vous un traitement particulier de la
vaisselle utilisée par Mme MARGUERITE ?**

OUI

NON

RÉPONSE 9




NON



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)

RÉPONSE 9



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)



Pour eux aussi





SARM cutané

QUESTION 10



Mme MARGUERITE peut-elle aller jouer au domino avec ses amies ?

OUI

NON

RÉPONSE 10



OUI



R101 : Il est recommandé de ne pas confiner systématiquement dans sa chambre un patient susceptible de déambuler auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AM)

R116 : Il est recommandé de ne pas interdire l'accès au plateau technique de rééducation, aux lieux communs de vie, pour les patients justifiant de mesures complémentaires de type contact sur un foyer infectieux ouvert, mais d'encadrer cet accès par des mesures d'hygiène spécifiques. (AM)

OUI



R101 : Il est recommandé de ne pas confiner systématiquement dans sa chambre un patient susceptible de déambuler auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AM)

R116 : Il est recommandé de ne pas interdire l'accès au plateau technique de rééducation, aux lieux communs de vie, pour les patients justifiant de mesures complémentaires de type contact sur un foyer infectieux ouvert, mais d'encadrer cet accès par des mesures d'hygiène spécifiques. (AM)



Pour eux aussi



Et M. ATCHOUM ?




R98 : Il est fortement recommandé de faire porter systématiquement un masque de soins (type chirurgical) à usage unique au patient présentant une infection respiratoire à SARM lorsqu'il sort de sa chambre. (AF)

Il est recommandé de faire porter systématiquement un masque de soins (type chirurgical) à usage unique au patient présentant une infection respiratoire à micro-organisme autre que SARM et justifiant de précautions complémentaires de type contact, lorsque celui-ci sort de sa chambre. (AM)



SARM cutané

QUESTION 11



Mme MARGUERITE doit être transférée à l'hôpital suite à une chute, que faites-vous ?


VOUS PREVENEZ SA FAMILLE

VOUS PREVENEZ LE SERVICE QUI L'ACCUEILLE DE SON PORTAGE BMR

REPONSE 11


VOUS PRÉVENEZ SA FAMILLE

**VOUS PRÉVENEZ LE SERVICE QUI L'ACCUEILLE DE
SON PORTAGE BMR**




VOUS PRÉVENEZ SA FAMILLE

VOUS PRÉVENEZ LE SERVICE QUI L'ACCUEILLE DE SON PORTAGE BMR



R104: Il est fortement recommandé d'organiser l'information systématique de tous les acteurs prenant en charge, même occasionnellement, un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)

VOUS PRÉVENEZ LE SERVICE QUI L'ACCUEILLE DE SON PORTAGE BMR



R104: Il est fortement recommandé d'organiser l'information systématique de tous les acteurs prenant en charge, même occasionnellement, un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)



Pour eux aussi



SARM bronchique



BMR urinaire




BHRe



SARM cutané

QUESTION 12



**Malheureusement, Mme MARGUERITE est décédée.
Quel entretien de la chambre réalisez-vous ?**


**ENTRETIEN APPROFONDI SELON LA PROCÉDURE
HABITUELLE**

**DÉSINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE
(DSVA)**




RÉPONSE 12

ENTRETIEN APPROFONDI SELON LA PROCÉDURE HABITUELLE




ENTRETIEN APPROFONDI AVEC LA PROCÉDURE HABITUELLE



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)

ENTRETIEN APPROFONDI AVEC LA PROCÉDURE HABITUELLE



R110: Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer un traitement spécifique de la vaisselle, des ustensiles et du linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact. (AF)



Pour eux aussi





QUESTION 13



M. PIERRE arrive dans votre structure, réalisez-vous un dépistage systématique à la recherche d'un portage de BMR ?

OUI

NON

RÉPONSE 13


NON



237 Il n'est pas recommandé de réaliser un dépistage systématique des porteurs de SAMR dans les ÉHPAD ni à l'entrée ni au cours du séjour. **Accord fort**

R64: Il est recommandé de ne pas dépister EBLSE :

- à l'admission en SLD, (AM)
- en cours de séjour en SLD, (AF)
- avant transfert vers le MCO. (AM)





BHRe

QUESTION 14




M. POLO est porteur d'une BHRe, réalisez-vous des dépistages chez les autres résidents de l'EHPAD ?

OUI

NON

RÉPONSE 14

NON




- Il n'est pas recommandé de dépistage en EHPAD.




SYNTHÈSE

BMR
asymptomatique
en EHPAD




**Précautions
Standard**

BMR
symptomatique
en EHPAD



**Précautions
Complémentaires
Contact (PCC)
pendant les soins**

BHRE
en EHPAD



NOUVELLES FICHES

<http://rhc-arlin.pasman.fr/>





SYNTHESE

BMR asymptomatique

PRÉCAUTIONS STANDARD

+++

Soins mouillant souillant

Sang, liquide biologique...

Toux, risque de projection

DAOM

Traitement habituel

Très rigoureuse

NON

Médecin traitant, en cas de transfert

OUI

Hygiène des mains

Tablier plastique UU

Port de gants

Masque

Déchets

Vaisselle, linge

Gestion des excréta

Dépistage des résidents

Information

Activité commune

BMR symptomatique

BHRe

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES CONTACT

Pendant les soins

+++

Soins contact direct

Sang, liquide biologique...

Toux, risque de projection

DASRI

Traitement habituel

Très rigoureuse

NON

Médecin traitant, en cas de transfert

OUI



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

