



Préparation cutanée et Prévention des ISO retour sur l'observation des pratiques

Réseau des Hygiénistes du Centre
RHC-arlin


CONTEXTE




Suivi des BN_{MCO} *S. aureus*



MRSA





CONTEXTE



BN_{MCO} *S. aureus* métis

/1000 JH






Qualité de la préparation cutanée avant un geste invasif

- Déterision

Nettoyage
Rinçage
Séchage

- Antiseptie




- Produits adéquats

Savons
Eau stérile
Antiseptiques
Compresse stériles

- Temps d'action

Méthode


- Observation des pratiques par les FOHH
(1^{er} semestre 2011)
- **39 ES participants**
- **920 observations**
 - 336 poses de DIV
 - **244 prépa. de l'opéré**
 - 228 poses de sonde urinaire
 - 112 ponctions sur CCI / hémocultures
- **Retour des résultats et Journée d**
(11 octobre 2011)





Détersion

- **Conformité : 64 %**
- **Non conformités :**
 - **22 % détersions non réalisées**
 - **12 % utilisations d'eau non stérile**
 - **8 % de compresses non stériles**




Détersion et « propreté »

	conformité (%)
• prépa. de l'opéré	64
• pose de SU	81

P < 0.001

***La détersion
« plus nécessaire » pour la pose de SU
et « moins nécessaire » pour la peau de l'opéré***



Antiseptie

- **Conformité : 90 %** *2 phases dans 70 % des cas*


non conformités

=

Non respect du temps d'action

*Le respect du temps d'action
« pas nécessaire »*

RESULTATS



Respect du séchage et antiseptique alcoolique

	respect du séchage (%)
ASQ non alcoolique	64
ASQ alcoolique	85

P < 0.001




Organisation

- **Délai > 30 minutes**
 - **Déterision / Antisepsie**
 - **Antisepsie / Incision**

9 cas (4 %)


AMELIORATIONS



2 axes


- Matériels et produits adéquats
- Privilégier les ASQ alcooliques lorsque leur utilisation est possible
- Améliorer la compréhension des enjeux de la prépa. Cutanée ►►► Formation

AMELIORATIONS




Détersion

Antiseptie



Antiseptie sans détersion




Antiseptie incomplète

RHC

Arlin

Réseau des Hygiénistes du Centre



CHR Orléans

CH Amboise, CH Bourges, CH Chartres, CH Chateaudun, CH Issoudun,
CH Gien, CH La Chatre, CH Le Blanc, CH Montargis, CH Nogent le Rotrou,
CH Romorantin, CH St Amant, CH Ste Maure de Touraine, CH Vendome,
CH Vierzon


CL Alliance Tours, CL Archette Olivet, CL Grainetières St Amand,
CL G de Fayre Bourges, PolyCL Blois, Pole Santé L de Vinci Chambray
HL Lour Picou Beaugency, HL Sully s/Loire

CI Velpeau Tours, CI Claude de France Blois, ESSR Les Buissonnets Olivet,
ESSR Manoir en Berry Pouligny, ESSR Luynes
HAD 18, 36, 41, 45 Montargis, 45 Orléans, 37



<http://rhc-arlin.com>





- BN endogènes
- clones staphylococciques émergents

