




CPIAS
Centre d'appui
pour la Prévention
des Infections Associées aux Soins
en région Centre-Val de Loire



Covid-19

Point d'actualité




Web conférence 21/10/2021

Point épidémiologique en région CVDL


Cas positifs au Covid19 - Centre




Personnes hospitalisées pour Covid19 - Centre




Personnes en réanimation pour Covid19 - Centre



Décès hospitaliers quotidiens du Covid19 - Centre



Circulation des variants



Points abordés

1. Vaccination, dose de rappel
2. Admission en MCO
3. Chambres doubles
4. Prise en charge des cas et des contacts à risque






1- VACCINATION: DOSE DE RAPPEL

Diminution de la protection 6 mois après vaccination


Figure 2: Comparison of the percentage of positive results among fully vaccinated individuals, according to time elapsed since the second vaccine dose



1. Israel A, Merzon E, Schäffer AA, Shenhar Y, Green I, Golan-Cohen A, et al. Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort. medRxiv. 2021:2021.08.03.21261496.

Efficacité de la dose de rappel

B Neutralization of Wild-Type Virus and the Delta Variant



Falsey AR. SARS-CoV-2 Neutralization with BNT162b2 Vaccine Dose. NEJM 2021

Efficacité de la dose de rappel

Primary Outcomes of Confirmed Infection and Severe Illness.*

Outcome	Nonbooster Group	Booster Group	Adjusted Rate Ratio (95% CI) [†]
Confirmed infection			11.3 (10.4–12.3)
No. of cases	4439	934	
No. of person-days at risk	5,193,825	10,603,410	
Severe illness			19.5 (12.9–29.5)
No. of cases	294	29	
No. of person-days at risk	4,574,439	6,265,361	

Dose de rappel

Personnes éligibles

- Résidents EHPAD/USLD
- Toute personne > 65 ans
- Personnes à très haut risque de forme grave
- Personnes sévèrement immunodéprimées
- Personnes avec pathologies associées à un risque de forme grave
- Personnes ayant reçu le vaccin Janssen
- Professionnels de santé
- Ensemble des salariés des secteurs de la santé et du médico-social
- Professionnels du transport sanitaire et pompiers
- Aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables
- Personnes de l'entourage des immunodéprimés (adultes > 18 ans).

DGS-Urgent N° 2021_106 Elargissement des publics éligibles à la dose de rappel
Avis HAS (13/10/21) Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place d'un rappel
par le vaccin à ARNm COMIRNATY

Liste des pathologies associées à un risque de forme grave

- **Trisomie 21**
- **Transplantation d'organe solide ou de CSH**
- **Insuffisance rénale chronique**
- **Diabète types 1 et 2**
- **Obésité avec IMC \geq 30**
- **Cancer ou hémopathie maligne**
- **Pathologies respiratoires chroniques...**
 - **Bronchopneumopathie obstructive**
 - **Insuffisance respiratoire**
 - **Asthme sévère**
 - **Fibrose pulmonaire**
 - **Syndrome d'apnée du sommeil**
- **Pathologies cardio-vasculaires**
 - **Hypertension artérielle compliquée**
 - **Antécédent d'AVC**
 - **Antécédent de chirurgie cardiaque**
 - **Insuffisance cardiaque**
 - **Antécédents de coronaropathie**
- **Maladies hépatiques chroniques, en particulier cirrhose**
- **Troubles psychiatriques**
- **Démence**
- **Immunodépression congénitale ou acquise**
- **Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie**
- **Pathologies neurologiques**
 - **Maladies du motoneurone**
 - **Myasthénie grave**
 - **Sclérose en plaques**
 - **Maladie de Parkinson**
 - **Paralysie cérébrale**
 - **Quadriplégie ou hémiplégie**
 - **Tumeur maligne primitive cérébrale**
 - **Maladie cérébelleuse progressive**

Référentiels personnes à risque de forme grave

- **DGS Urgent n° 2021-90 (27/08/21) Lancement de la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 pour les populations prioritaires**
- **HAS 1er mars 2021 :Actualisation des facteurs de risque de formes graves de la covid-19 et des recommandations sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner HAS 1er mars 2021**
- **COSV (13 janvier 2021) Note relative à la vaccination en très haute priorité des personnes à très haut risque**
- **COSV (14 janvier 2021) Vaccination en très haute priorité des personnes à très haut risque Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19 Filières de Santé Maladies Rare**
- **COSV Vaccination en très haute priorité des personnes à très haut risque Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19**
- **HCSP 29/10/2020 Avis relatif à l'Actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave de covid-19 29/10/2020**
- **HCSP 20/04/2020 Actualisation de l'avis relatif aux personnes à risque de forme grave de covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics-20/04/2020**

Dose de rappel

Personnes non éligibles

- **Tous les autres**

En attente des recommandations

- **Personnes ayant fait la covid-19 puis vaccinées 1 dose**
- **Personnes infectées après primovaccination**

DGS-Urgent n°2021_90 Lancement de la campagne de rappel vaccinal contre la COVID-19 pour les populations prioritaires

DGS-Urgent n°2021_106 Elargissement des publics éligibles à la dose de rappel
Avis HAS (13/10/21) Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place d'un rappel par le vaccin à ARNm COMIRNATY

Stratégie vaccinale : dose de rappel

Immunocompétents



À partir de 6 mois



**Immunodéprimés
sévéres**



Entre 3 et 6 mois



**Primo-injection
Janssen**



≥ 4 semaines



COMIRNATY® (Pfizer)

Avis de l'HAS du 23 Août 2021

Vaccination antigrippale concomitante pour les personnes éligibles

**Avis HAS (13/10/21) Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place d'un
rappel par le vaccin à ARNm COMIRNATY**



2- ADMISSIONS EN MCO

SF2H (29/09/2021)

Note relative à la protection des patients
et des professionnels en contexte Covid-19

Dépistage patients et admissions en MCO

Patients non vaccinés

PCR systématique

Exigible pour tous, hors situation d'urgence

**Avant toute chirurgie ou hospitalisation
conventionnelle**

SF2H (29/09/2021) Note relative à la protection
des patients et des professionnels en contexte Covid-19

SFAR (juin 21) Préconisations pour l'adaptation de l'offre de soins
en anesthésie et réanimation dans le contexte de pandémie de Covid-19

Dépistage patients et admissions en MCO

Patients vaccinés

**Selon la situation épidémiologique
régionale ou locale**

**Chirurgie à risque
ou
patients à risque de forme grave**

PCR

**Autres chirurgies
ou
hospitalisation conventionnelle**

**Pas de
PCR**



3- CHAMBRES DOUBLES

SF2H (29/09/2021)

Note relative à la protection des patients
et des professionnels en contexte Covid-19


Chambres doubles en ES et EMS

Chambre double possible

- 2 patients Covid-19 (quel que soit le variant)
- 2 patients immunisés et non immunodéprimés

Chambre seule fortement recommandée / nécessaire

- Suspect covid-19
- Patient contact à risque
- Personne à risque de forme grave immunisée ou non immunisée
- Sévèrement immunodéprimé ou à risque d'échec vaccinal
- Nécessitant des manœuvres respiratoires à haut risque d'exposition
- Troubles envahissant du comportement



4- PRISE EN CHARGE DES CAS ET CONTACTS


SF2H (29/09/2021)

Note relative à la gestion de cas acquis ou de cluster d'infections
par le SARS-CoV-2 chez des patients
ou des professionnels en établissements de santé.

Durée d'isolement et PC Covid des patients/résidents

ES / ESMS

Quel que soit le variant



Précautions
COVID-19

~~14j~~

14j

NON SYMPTOMATIQUE
NON IMMUNODEPRIME

14j

SYMPTOMATIQUE
NON IMMUNODEPRIME

~~14j~~

24j

NON SYMPTOMATIQUE ET
IMMUNODEPRIME*

24j

SYMPTOMATIQUE GRAVE
ET /OU
IMMUNODEPRIME*

* transplantés d'organes solides ou cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopénisante, patients dialysés chroniques, patients traités par immunosuppresseurs forts (anti-CD20 ou anti-métabolites)



Conduite à tenir devant la découverte d'un cas Covid-19 chez un PATIENT

Mesures pour le patient Covid-19

PC Covid

Identification des contacts à risque :

- parmi les patients
- parmi les professionnels

Dépistage des contacts à risque à J0 et J7

Mesures pour les contacts

Prise en charge des patients contacts à risque

Contact à risque modéré (vacciné)

Contact à risque élevé (non vacciné)

- PC Covid 7 jours



Conduite à tenir devant la découverte d'un cas Covid-19 chez un résident

Mesures pour le résident Covid-19

PC Covid

Identification des contacts à risque :

- parmi les résidents
- parmi les professionnels

Dépistage des contacts à risque à J0 et J7

Prise en charge des résidents contacts à risque

Mesures pour les contacts

Contact à risque modéré (vacciné)

- Surveillance

Contact à risque élevé (non vacciné)

- PC Covid 7 jours
- Arrêt des activités collectives
- Repas en chambre
- Visites au cas par cas

Conduite à tenir pour les professionnels de santé (cas et contact à risque)

<p>Professionnel contact à risque modéré ou élevé</p>	<p>Pas d'éviction systématique mais respect strict des mesures barrières</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ PCR immédiate + J7 (et si apparition de symptômes)▪ Eviction dès l'apparition de symptômes ou si doutes sur la possibilité à respecter les mesures barrières :<ul style="list-style-type: none">○ 7 jours si cas en dehors du foyer familial○ 17 jours si cas au foyer familial
<p>Professionnel cas Covid-19</p>	<p>Eviction Systématique 10 jours</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Puis mesures particulières 7 jours▪ <u>Si nécessaire à la continuité de service</u> ET si asymptomatique ET vacciné schéma complet : dérogation possible en respectant scrupuleusement les mesures barrières

Maintien des mesures barrières



Pour tous

Mesures individuelles

Mesures collectives

Distance physique

Hygiène des
mains

Port du masque


Bionettoyage

Aération



Les messages clés

- Vaccination : dose de rappel
- Chambres doubles avec contre-indications multiples
- Et toujours haut niveau de respect des PS et des mesures barrières



Prochaine WEB conférence en fonction de l'actualité

The screenshot shows the website <https://rhc-arlin.pasman.fr>. The header includes the RHC logo (a hexagonal grid with numbers 26, 45, 37, 41, 35) and the text "CPIAS Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins en région Centre-Val de Loire". A map of the Loiret region is also visible. A search bar contains the text "Rechercher sur le site...".

The main content area features a bar chart titled "REANIMATION 22-10-2020; région CVDL" showing a peak in reanimation cases around late October 2020. To the right, a dark blue box contains the following text:

NOUVELLE WEBCONF COVID-19

Le Sars-Cov2 circule de nouveau de façon active dans notre région. Vous êtes tous impactés. Les mesures de gestion sont parfois complexes à mettre en œuvre. Nous vous proposons une formation ouverte à tous, vendredi 23 octobre prochain à 14h00 sous forme de webconférence. Vous pouvez obtenir le lien ICI Elle est ouverte à l'ensemble des professionnels de vos structures.

Below the chart and text are four columns of links:

- CALENDRIER**: Calendrier des actions. Retrouvez les dates importantes pour 2020. [Lire plus](#)
- PRIORITES REGIONALES**: Le Programme du RHC. Le RHC élabore chaque année un programme d'action et définit une ou deux priorités régionales... [Lire plus](#)
- TRAVAUX, COLLABORATIONS**: Les travaux et collaborations. Valorisation des travaux, Publication de la CRENO, Valorisation des Audits... [Lire plus](#)
- PHOTOGRAPHIES**: Iconographie du RHC. Photos RHC à télécharger. [Lire plus](#)

At the bottom, there is a footer with "Edit" and "DERNIERES ACTUS". A small note at the very bottom reads "Transfert des données depuis ssl.google-analytics.com..."